

# Resistenta parasiter – de finns i Sverige idag

## Idag upptäcks resistenta parasiter på upp till tio svenska gårdar varje år!

Resistens innebär genetisk motståndskraft mot avmaskningsmedel hos maskarna. Det vill säga det finns fortfarande ägg i träcken efter avmaskning, man blir aldrig av med dem.

Hur skulle du göra om resistenta parasiter upptäcktes på din gård? Förstörda förutsättningar för livdjurshandel, dålig hälsa och tillväxt, lammförluster – det kostar mycket att drabbas, både ekonomiskt, känslomässigt och i form av ökat arbete. Vi kan inte längre ta lätt på risken, även din besättning kan drabbas.

## Hur förhindrar man att få in parasiter?

### 1. Livdjursköp är den absolut största riskfaktorn

- **Sök information från säljaren.** Fråga säljaren om träckprov + behandlingskontroll gjorts. Fråga efter obduktionssvar om man haft problem. Begär [hälsodeklaration](#).
- **Köp från så få besättningar** som möjligt.
- **Har säljaren importerat livdjur** är det extra viktigt att fråga efter vilka kontroller som gjorts för att säkerställa att djuren inte fört med sig resistenta tarmparasiter.
- **Följ aktuella karantänsrekommendationer\*.**
  - Ta prov och avmaska första dagen.
  - Ta ytterligare prov 7–10 dagar senare och skicka för behandlingskontroll.
  - Rådgör med veterinär.
- **Seminerings kan användas** strategiskt för att undvika eller minimera livdjursinköp.
- **Import av sperma eller embryon** är ett säkert sätt att inte köpa resistenta parasiter vid behov av import av genetiskt material.

### 2. Avmaska endast vid behov

- **Ta träckprov** för att veta när avmaskning behövs.
- **Använd "rätt" preparat.** Rådgör med veterinär.
- **Ge tillräcklig dos** och med rätt teknik.
- **Kontrollera effekt** genom att göra behandlingskontroll.
- **Utred vid misstanke** om resistens.
  - Om lammen "inte är på hugget" och inte blir bättre efter avmaskning.
  - Vid hög foderåtgång vintertid för att hålla tackornas hull hyfsat.
  - Höga äggantal i parasitprov.
  - Ta hjälp för att utreda om problem av den här typen beror på resistenta parasiter!

### 3. Betesplan

- **Träckprov före betessläpp**, men helst inte tidigare än andra halvan av april då en del arter av maskar, t ex stora magmasken, kan vara i vinterdvala\*\*.
- **Välkomstbete**
- **Återväxt**
- **Växelbete** med annat djurslag.
- **Provtagning vid strategiska tidpunkter** och avmaskning vid behov.

### 4. Fråga!

- **Gård & Djurhälsans fårhälsoveterinärer** kan mycket om resistenta parasiter hos får, och samverkar framför allt med SLU, men även med SVA och VÄXA. De kan hjälpa till med förebyggande rådgivning och utredning vid problem.
- **Vid planer på livdjursimport**, kontakta Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) för fri rådgivning.

### Läs mer

Gård & Djurhälsan: Karantänsrekommendationer avseende mag- och tarmparasiter

Gård & Djurhälsan: Särskild varning för resistenta tarmparasiter

Gård & Djurhälsan: Inköps- och besöksrutiner för fårbesättningar

Gård & Djurhälsan: Håll koll på masken/Avmaska på rätt sätt

Gård & Djurhälsan: Parasitprojekt under 2018

Gård & Djurhälsan: Med fokus på Bete och parasiter

---

*\*Rekommendationerna är framtagna i samarbete mellan Gård & Djurhälsan, SVA, SLU och Växa.*

*\*\*Notera att bara en del av maskarna går i dvala under vintern, vilket innebär att det fortfarande kan finnas aktiva maskar som stör djuren under vintertid. I synnerhet stora magmaskar, vilka då kan påvisas med träckprov.*

*Sammanställning Anna Bergström (SF), faktagranskning Katarina Gustafsson (G&D)*